

DERS / KAZANIM 10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz	SORU SAYISI 25 Soru	ÖNERİLEN SÜRE 50 Dakika	MÜFREDAT UYUMU %100 MEB Uyumlu
--	------------------------	----------------------------	-----------------------------------

1. Ekvatorial yağmur ormanlarında ağaçların boyları 60 metreyi aşabilmekte ve bu durum orman altı katmanında ışık rekabetine yol açmaktadır. Bu ekosistemde yaşayan bir bitki türünün hayatta kalabilmek için ışığa daha hızlı ulaşma çabası aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

- A) Kök sistemlerinin çok derinlere inmesi
- B) Gövde yapılarının kalın ve mantarsı olması
- C) Epifit bitkilerin diğer ağaçların dalları üzerinde yaşaması
- D) Yapraklarının su kaybını önlemek için iğne şeklinde olması
- E) Tohumlarının rüzgarla çok uzak mesafelere taşınması

2. Akdeniz iklim bölgesinde görülen maki bitki topluluğunu oluşturan bitkilerin yaprakları genellikle küçük, sert, cilalı veya tüylüdür. Bu morfolojik özelliklerin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kış ılıkliğından maksimum düzeyde faydalanmak
- B) Yaz kuraklığında terlemeyi azaltarak su kaybını önlemek
- C) Topraktaki aşırı tuzu dışarı atmak
- D) Şiddetli rüzgarlara karşı gövdeyi korumak
- E) Yabani hayvanların yaprakları yemesini engellemek

3. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün geniş yapraklı ormanlar, karma ormanlar, iğne yapraklı ormanlar ve alpin çayırlar şeklinde kuşaklar oluşturduğu gözlenmektedir. Bu değişimde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nem oranının yükseldikçe artması
- B) Toprak kalınlığının azalması
- C) Sıcaklığın her 200 metrede yaklaşık 1°C azalması
- D) Rüzgar hızının yükseklerde artması
- E) Işıklanma süresinin dağın zirvesinde daha uzun olması

4. Savan bitki topluluğu, uzun boylu otlar ve yer yer görülen tek tük ağaçlardan (akasyalar) oluşur. Bu bitki topluluğunun görüldüğü bölgelerde yağış rejimi hakkında ne söylenebilir?

- A) Her mevsim bol yağışlıdır.
- B) Yağışlar yıl içine düzenli dağılmıştır.
- C) Yazlar kurak, kışlar bol yağışlıdır.
- D) Yazlar yağışlı, kışlar belirgin bir kuraklık dönemidir.
- E) Yıllık toplam yağış miktarı 250 mm'nin altındadır.

5. Türkiye'nin iç kesimlerinde, ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan ve genellikle ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yazın sararan ot topluluklarına ne ad verilir?

- A) Alpin Çayır
- B) Garig
- C) Antropojen Step
- D) Psödömaki
- E) Tundra

6. Muson ormanları ile Ekvatorial yağmur ormanları karşılaştırıldığında, Muson ormanlarının en belirgin farkı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tür çeşitliliğinin daha fazla olması
- B) Kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlardan oluşması
- C) Her mevsim yeşil kalması
- D) Sadece iğne yapraklı ağaçlardan meydana gelmesi
- E) Sıcaklığın yıl boyu 25 derecenin üzerinde olması

7. Sibiryaya, Kanada ve Kuzey Avrupa'nın sert karasal iklim bölgelerinde görülen, soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara ne ad verilir?

- A) Karma ormanlar
- B) Muson ormanları
- C) Tayga ormanları
- D) Yağmur ormanları
- E) Galeri ormanları

8. Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarında ormanlar deniz seviyesinden başlarken, Güney Anadolu Dağları'nın güneye bakan yamaçlarında maki toplulukları deniz seviyesinden başlar. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toprak yapısının farklı olması
- B) Bakı etkisi
- C) Nemlilik ve yağış koşullarının farklılığı
- D) Boylam farkı
- E) Yer şekillerinin uzanış doğrultusu

9. Çöl bitkilerinin (kaktüs vb.) kuraklığa dayanabilmek için geliştirdiği adaptasyonlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gövdelerinde su depolama
- B) Çok geniş ve ince yapraklara sahip olma
- C) Derin kök sistemleri geliştirme
- D) Yaprakların diken şeklini alması
- E) Stomaların (gözeneklerin) yaprağın derinliklerine gömülmesi

10. Tundra bitki topluluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yılın büyük bölümünde donmuş olan toprağın yazın çözülmesiyle ortaya çıkarlar.
- B) Yosun, liken ve bazı küçük çalılar ana unsurlarıdır.
- C) Sadece Güney Yarımküre'de Antarktika kıyılarında görülürler.
- D) Sıcaklığın çok düşük olması bitki boylarının kısa kalmasına neden olmuştur.
- E) Tarımsal faaliyetler için uygun olmayan bir iklim kuşağındadır.

11.Karadeniz kıyı kuşağında, ormanların tahrip edildiği yerlerde makiye benzeyen ancak kışın yaprağını döken türlerin de bulunduğu 'yalancı maki' topluluğu görülür. Bu topluluğun bilimsel adı nedir?

- A) Garig
- B) Psödömaki
- C) Antropojen Step
- D) Savan
- E) Çayır

12.Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi 'Çalı Formasyonu' içerisinde değerlendirilemez?

- A) Zakkum
- B) Defne
- C) Sandal
- D) Kayın
- E) Lavanta

13.Geçmiş jeolojik dönemlerdeki iklim koşullarında yaşamış, günümüzde ise sadece uygun mikroklimalarda varlığını sürdüren 'kalıntı' bitkilere ne ad verilir?

- A) Endemik Bitki
- B) Relikt Bitki
- C) Kozmopolit Bitki
- D) Egzotik Bitki
- E) Kültür Bitkisi

14.Sadece belirli bir bölgede yetişen, dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmayan bitki türlerine 'endemik bitki' denir. Türkiye'de endemik tür sayısının çok fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

- A) Yer şekillerinin çeşitliliği
- B) Farklı iklim tiplerinin görülmesi
- C) Jeolojik süreçlerdeki iklim değişimleri
- D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
- E) Toprak türlerinin çeşitliliği

15.Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan, diz boyunu geçmeyen, çok kurakçıl ve seyrek çalı topluluklarına 'garig' denir. Aşağıdakilerden hangisi bir garig türüdür?

- A) Kızılçam
- B) Lavanta
- C) Gürgen
- D) Sedir
- E) Ladin

16.Bir bölgedeki doğal bitki örtüsünün tür ve yoğunluk bakımından zenginliği; o bölgenin yağış miktarı, sıcaklık koşulları ve toprak verimliliği ile doğrudan ilişkilidir. Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinde bitki örtüsünün en cılız olması beklenir?

- A) Amazon Havzası
- B) Batı Avrupa Kıyıları
- C) Orta Avustralya
- D) Güneydoğu Asya
- E) Kongo Havzası

17.Sert karasal iklimin görüldüğü Erzurum-Kars çevresinde yaz yağışlarıyla yeşeren, gür ve uzun boylu otlardan oluşan topluluklara ne ad verilir?

- A) Bozkır
- B) Savan
- C) Alpin Çayır
- D) Maki
- E) Tundra

18. Türkiye'de Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde maki, makilerin tahrip edildiği yerlerde ise garigler gelişir. Bu durum bitki coğrafyasında nasıl tanımlanır?

- A) Doğal denge
- B) Bitki ardılığı (Süksesyon)
- C) Vejetasyon bozulması (Degradasyon)
- D) Adaptasyon
- E) İklimsel değişim

19. Bozkır (step) bölgelerinde yetişen; geven, çoban yastığı, üzerlik ve yavşan otu gibi bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Her mevsim yeşil kalmaları
- B) Çok fazla su tüketmeleri
- C) Kurakçıl karakterde olmaları
- D) Sadece kışın büyümeleri
- E) İğne yapraklı olmaları

20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 'İklim Tipi - Karakteristik Bitki Örtüsü' bakımından yanlıştır?

- A) Akdeniz İklimi - Maki
- B) Ilıman Okyanusal İklim - Karma Orman
- C) Sert Karasal İklim - Tayga
- D) Çöl İklimi - Kaktüs
- E) Muson İklimi - Savan

21. Dünyadaki bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler düşünüldüğünde, Kuzey Yarımküre'de dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre daha gür bitki örtüsüne sahip olması veya bitki üst sınırının daha yüksek olması neyle açıklanır?

- A) Enlem
- B) Bakı
- C) Yükselti
- D) Boylam
- E) Karasallık

22. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi Türkiye'nin sadece belirli bir yöresine özgü 'endemik' bir türdür?

- A) Meşe
- B) Karaçam
- C) Kasnak Meşesi
- D) Kızılçam
- E) Kayın

23. Bir bölgede yıllık yağış miktarı 200 mm'nin altına düşüyor, bitkiler su biriktirme özelliğine sahip ve geniş kök sistemleri geliştiriyorsa bu bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

- A) Dağlık bir alandır.
- B) Ekvatorial bölgededir.
- C) Şiddetli kuraklık yaşanmaktadır.
- D) Her mevsim yağışlıdır.
- E) Toprak her zaman donmuş haldedir.

24.Orta kuşak karma ormanlarında hem geniş yapraklı hem de iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunur. Bu durumun yaşandığı bir bölgenin iklim özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yazların çok sıcak ve kurak geçmesi
- B) Kışların aşırı soğuk ve uzun olması
- C) Her mevsimin yağışlı ve ılıman geçmesi
- D) Yıllık sıcaklık farkının 50 dereceden fazla olması
- E) Yağışın sadece kar şeklinde düşmesi

25.Aşağıdaki bitki formasyonlarından hangisi 'Ot Formasyonu' kategorisinde yer almaz?

- A) Savan
- B) Bozkır
- C) Çayır
- D) Garig
- E) Tundra

10. Sınıf Coğrafya — Bitki Toplulukları

Eğitim yolculuğunuzda size destek olmak için hazırladığımız **10. Sınıf Coğrafya Bitki Toplulukları** testi, tamamen yeni nesil eğitim anlayışıyla kurgulanmıştır. TestYurdu kalitesiyle sunulan bu dökümanla sınavlara eksiksiz hazırlanın.

» [Testi İnteraktif \(Online\) Çöz](#)

» [10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz](#)



QR Kod ile Çöz

⚠ **Cevap anahtarına ulaşmak ve testi online çözmek için yukarıdaki bağlantıları kullanabilir veya yukarıdaki QR kodu taratabilirsiniz.**